


AB- RAVI

AMBULATOORSELT



INFEKTSIOON	RHK-10		AB	Kogus	Kestvus
Tonsilliit	J03.0	I valik	Fenoksümetüül- penitsilliin	2 miljonit RÜ ×2	5 p
		alternatiiv	Klaritromütsiin	500mg x2	5 p
Äge bakt. rinosinusiit	J01. ..	I valik	Amoksitsilliin	500mg x3	5 p
		alternatiiv	Klaritromütsiin	500mg x2	5 p
Äge keskkõrvapõletik	H65.0 H66.0	I valik	Amoksitsilliin	500mg x3	5 p
		alternatiiv	Klaritromütsiin	500mg x2	5 p
Kopsupõletik	J18.9	I valik	Amoksitsilliin	750mg x3	5 p
		alternatiiv	Doksütsükliin	200mg x1 I päeval edasi 100mg x1	5 p
Tsüstiit	N30.0	I valik	Nitrofurantoiin	50mg x 3-4	3 p
		eGFR <45	TMP-SMX	eGFR <45 800/160mg x2 eGFR <30 400/80mg x2 eGFR <15 ei tohi kasutada	3 p
Püelonefriit	N10	I valik	Tsiprofloksatsiin (EI kasutada- rasedatel ja eakatel)	500mg x2	7p 14p (M)
		I valik	TMP-SMX	800/160mg x2	7p 14p (M)

Täiskasvanud patsiendi puhul, kellel on penitsilliiniallergia, kasutage antibakteriaalseks raviks klaritromütsiini või doksütsükliini (vt millist alternatiivset ab-ravi määrata tabelist)

INFEKTSIOON	RHK-10		AB	Kogus	Kestvus
Ränderütem ehk Lyme tõbi	A69.2	I valik	Doksütsükliin	100mg x2	10 p
		I valik	Amoksitsilliin	500mg x3	14 p
Tselluliit	L03. ..	I valik	Tsefadroksiil	500mg x2	5-7 p
		alternatiiv	Klindamütsiin	300mg x4	5-7 p
Erüsiipel	A46	I valik	Tsefadroksiil	500mg x2	5-7 p
		alternatiiv	Klindamütsiin	300mg x4	5-7 p
Impetiigo	L01. ..	Lokaalne ravi	Fusidiinhappe Batsitratsiin / neomütsiini salv	2-3 x päevas	5-7 p
		Süst. ravi	Tsefadroksiil	500mg x2	5-7 p
		alternatiiv	Klindamütsiin	300mg x4	5-7 p
Loomahammustus	W54. .. W55. ..	I valik	Amoksitsilliin- klavulaanhape	875/125 mg x2	profülaktika 3-5 p
		alternatiiv	Doksütsükliin	100mg x2	profülaktika 3-5 p
Äge verine kõhulahtisus		I valik	Asitromütsiin	500mg x1	3 p
(empiiriline ravi)		II valik	TMP-SMX	960mg x2	3 p
Salmonella sp	A02. ..	I valik	Asitromütsiin	500mg x1	5-7 p
		II valik	TMP-SMX	960mg x2	5-7 p
Shigella sp	A03. ..	I valik	Asitromütsiin	500mg x1	3 p
		II valik	TMP-SMX	960mg x2	5 p
Campylobacter jejuni	A04.5	I valik	Asitromütsiin	500mg x1	3 p või kuni sümp. kadumiseni
Clostridium difficile	A04.7	kerge kulg	Metronidasool	500 mg x3	10 p
		raske kulg	Vankomütsiin	125 mg x4	10 p

AB- RAVI

AMBULATOORSELT

LAPSED



INFEKTSIOON	RHK-10		AB	Kogus	Kestvus
Tonsilliit	J03.0	I valik	Fenoksümetüül- penitsilliin	<27 kg: 400 000 RÜ × 3 >27 kg: 800 000 RÜ × 3	5 p
		alternatiiv	Klaritromütsiin	15 mg/kg ööp jagatuna 2 annuseks	5 p
Äge bakt. rinosinusiit	J01. ..	I valik	Amoksitsilliin	40-60 mg/kg ööp jagatuna 3 annuseks	5 p
		alternatiiv	Klaritromütsiin	15 mg/kg ööp jagatuna 2 annuseks	5 p
Äge keskkõrvapõletik	H65.0 H66.0	I valik	Amoksitsilliin	40-60 mg/kg ööp jagatuna 3 annuseks	5-7 p
		alternatiiv	Klaritromütsiin	15 mg/kg ööp jagatuna 2 annuseks	5-7 p
Kopsupõletik	J18.9	I valik	Amoksitsilliin	40-60 mg/kg ööp jagatuna 3 annuseks	5 p
		alternatiiv	Klaritromütsiin	15 mg/kg ööp jagatuna 2 annuseks	5 p
Tsüstiit	N30.0	I valik	TMP-SMX	6-12 mg/kg ööp (TMP i järgi) jagatuna 2 annuseks	3-5 p
		II valik	Nitrofurantoiin	5-7 mg/kg ööp jagatuna 4 annuseks	3-5 p
Püelonefriit	N10	I valik	Amoksitsilliin- klavulaanhape	30-40 mg/kg ööp (amoksi järgi) jagatuna 3 annuseks	7-10 p
		alternatiiv	TMP-SMX	6-12 mg/kg ööp (TMP i järgi) jagatuna 2 annuseks	7-10 p

Patsiendi puhul, kellel on penitsilliiniallergia, kasutage antibakteriaalseks raviks klaritromütsiini või TMP-SMX (vt üle tabelist, millist ab valida antud juhul)

- * > 40 kg kaaluval lapsel kasutatakse täiskasvanute annuseid
- < 40 kg kaaluval lapsel kehakaalu alusel annuse määramisel ei ületata täiskasvanu annuseid

INFEKTSIOON	RHK-10		AB	Kogus	Jagatuna annuseks	Kestvus
Ränderütem ehk Lyme tõbi	A69.2	< 8a (> 8a; < 50 kg)	Amoksitsilliin	50 mg/kg ööp	/ 3	14 p
		> 8a > 50 kg	Doksütsükliin	100mg x2		10 p
		> 8a > 50 kg	Amoksitsilliin	500mg x3		14 p
Tselluliit Erüsiipel	L03. ... A46	I valik	Tsefadroksiil	30 mg/kg ööp	/ 2	5–7 p
		alternatiiv	Klindamütsiin	15 mg/kg ööp	/ 2	5–7 p
Impetiigo	L01. ...	Lokaalne ravi	Fusidiinhappe Batsitratsiin / neomütsiini salv	2–3 x päevas		5–7 p
		Süst. ravi	Tsefadroksiil	30 mg/kg ööp	/ 2	5–7 p
		alternatiiv	Klindamütsiin	15 mg/kg ööp	/ 2	5–7 p
Looma- hammustus	W54. ... W55. ...	I valik	Amoksitsilliin- klavulaanhape	30–40mg/kg ööp (amoksi)	/ 3	5–7 p
		alternatiiv	TMP-SMX	6–12 mg/kg ööp (TMP i)	/ 2	5–7 p
Äge verine kõhulahtisus		I valik	Asitromütsiin	10 mg/kg x1		3 p
(empiiriline ravi)		II valik	TMP-SMX	6–12 mg/kg ööp (TMP)	/ 2	3 p
Salmonella sp ja Shigella sp	A02. ... A03. ...	I valik	Asitromütsiin	10 mg/kg x1		3–5 p
		II valik	TMP-SMX	6–12 mg/kg ööp (TMP)	/ 2	3–5 p
Campylobacter jejuni	A04.5	I valik	Asitromütsiin	10 mg/kg x1		3–5 p

GRAM POSITIVE							GRAM NEGATIVE									
Cocci					Anaerobes		Cocci/Coccobacilli			Bacilli						
MRSA	S. epidermidis (coagulase -ve Staphylococcus)	MSSA	Enterococcus		Streptococcus	Clostridium ¹ , Peptostreptococcus	Bacteroides, Fusobacterium	Neisseria meningitidis	Haemophilus influenzae	Moraxella	E.coli	Klebsiella	Proteus mirabilis	Pseudomonas	ESCHAPPM ² organisms	Legionella
			Faecium	Faecalis												
				Penicillin				Penicillin								
				Amoxicillin ³				Amoxicillin								
		Amoxicillin-clavulanate		Amoxicillin-clavulanate												
		Flucloxacillin		Flucloxacillin												Azithromycin, Erythromycin
Clindamycin		Clindamycin		Clindamycin ³												
Rifampicin/Fusidic Acid				Fusidic Acid		Metronidazole ⁴	Rifampicin/ Fusidic Acid	Rifampicin								
Vancomycin/Teicoplanin ⁵ , Linezolid, Daptomycin						Vancomycin/ Teicoplanin										
Co-trimoxazole				Co-trimoxazole											Co-trimoxazole Trimethoprim	
				Trimethoprim							Trimethoprim					
Gentamicin ⁶		Gentamicin ⁶		Gentamicin/ Tobramycin				Gentamicin/Tobramycin								
							Ciprofloxacin, Aztreonam								Ciprofloxacin	
	Moxifloxacin			Moxifloxacin ³										Moxifloxacin		
	Cephazolin			Cephazolin			Cephazolin			Cephazolin						
	Cefuroxime, Ceftriaxone			Cefuroxime, Ceftriaxone			Cefuroxime ⁷ , Ceftriaxone									
								Ceftazidime ⁸								
	Cefepime			Cefepime			Cefepime									
	Ticarcillin-clavulanate															
	Piperacillin-tazobactam			Piperacillin-tazobactam												
	Meropenem, Imipenem		Imipenem	Meropenem, Imipenem												
	Ertapenem			Ertapenem										Ertapenem		
Tigecycline								Tigecycline					Tigecycline			

MÄRKMED